



Airmust POP pod pré-rempli

ATTENTION : CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES MINEURS ET LES NON-FUMEURS

Ce produit est déconseillé aux mineurs ainsi qu'aux femmes enceintes ou allaitantes. Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer à utiliser ce produit. Conservez cette notice, car elle contient des informations importantes dont vous pourriez avoir besoin ultérieurement.

Les cartouches pré-remplies AIRMUST POP sont spécialement conçues pour fonctionner avec la batterie AIRMUST POP.



INCLUS :

2 cartouches pré-remplies Airmust POP scellées

1 manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS :

Capacité d'e-liquide : 2 ml

Nombre de bouffées : jusqu'à 600 bouffées

Type : non rechargeable

Résistance : 1,2 Ω

Dimensions : $\varnothing 16 \times 52 \text{mm}$

MODE D'EMPLOI

1. Enlevez les protections de la cartouche pré-remplie.
2. Insérez votre cartouche dans la batterie AIRMUST POP. Il se peut que votre batterie AIRMUST POP ait besoin d'être rechargée. Utilisez un câble USB-C avec un chargeur d'une sortie de 5V pour ce faire.

INSTRUCTION POUR LE STOCKAGE

Veillez toujours à ce que le réservoir soit entièrement fermé et en position verticale. Conservez ce produit à une température comprise entre 18 et 30 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne le réfrigérez pas, ne le congélez pas, ne le chauffez pas et ne stockez pas le produit à une température supérieure à 30 °C.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Si vous ressentez des effets secondaires à la suite de l'utilisation de ce produit, veuillez appeler le Centre antipoison local.

CONTRE-INDICATIONS POSSIBLES

PROPYLÈNE GLYCOL :

- Peut produire des effets indésirables chez les personnes traitées au disulfirame ou au métronidazole. Des réactions allergiques peuvent se produire chez les personnes ayant des antécédents d'atopie, d'eczéma infantile ou de rhinite. Une acidose lactique peut survenir lorsque de grandes quantités de propylène glycol sont consommées par des enfants, des femmes enceintes, ou des personnes souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale.

GLYCÉROL :

Les risques de déshydratation sont accrus chez les personnes âgées et les individus déjà déshydratés.

ADDICTIVITÉ

Ce produit contient de la nicotine, une substance qui crée une forte dépendance et dont l'utilisation n'est donc pas recommandée aux non-fumeurs.

Aucun autre ingrédient de ce produit, hormis la nicotine, n'est connu pour créer une dépendance.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Les personnes qui utilisent l'e-cigarette pour la première fois peuvent ressentir une irritation de la bouche, une sécheresse de la gorge ou une toux. Si les symptômes persistent pendant plus de 48 heures ou s'aggravent, consultez un médecin généraliste et signalez les détails de l'incident conformément aux instructions fournies dans la section "DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES".

Des effets de sevrage de la nicotine peuvent également se produire en cas d'utilisation d'une dose insuffisante pour satisfaire les envies de fumer. Il peut

TOXICITÉ

Ce produit contient de la nicotine, qui peut avoir des effets toxiques en cas de consommation orale, en particulier chez les nourrissons et les mineurs.

Ne buvez pas ce produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin généraliste avec cette notice.

En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau froide et continuez de rincer pendant 10 à 15 minutes.

SERVICE CLIENTÈLE

AIRMUST

Les halles de la vape